

Памятка для матери ВАШ РЕБЕНОК И ВИЧ

Ребенок в утробе матери имеет общее с ней кровообращение. Если у матери ВИЧ, ребенок может заразиться до или во время родов, а также при грудном вскармливании. Риск заражения ребенка от матери снижается проведением



нескольких этапов химиопрофилактики «вертикального пути передачи ВИЧ»:

- прием антиретровирусных препаратов женщиной во время беременности;
- прием антиретровирусных препаратов женщиной во время родов;
- дача антиретровирусных препаратов ребенку с момента рождения и отказом от грудного вскармливания.

В первые месяцы жизни ребенок, родившийся от ВИЧ-положительной матери, в любом случае будет иметь положительный результат анализа (ИФА на ВИЧ), поскольку в его крови присутствуют

антитела, перешедшие от матери. Если ребенок не заразился ВИЧ, со временем материнские антитела исчезнут.

Вы должны знать, что:

1. С рождения ребенок получает антиретровирусный препарат (ретровир в сиропе 4 раза в день (в 6ч., 12ч., 8ч., и 24ч.)), прием которого необходимо продолжить до 6-ти недельного возраста (при выписке флакон с лекарством Вы получите вместе с рекомендациями по дозировке). Дозу препарата необходимо рассчитывать (участковому педиатру или детскому инфекционисту) еженедельно по весу ребенка.



2. В первые сутки ребенку сделана прививка от вирусного гепатита В. Дальнейшая вакцинация проводится по месту жительства по схеме 0-1-2-12 мес.

3. Ваш ребенок не получил в родильном доме прививку от туберкулеза (БЦЖ), поэтому будьте бдительны, избегайте контакта с больными бронхолегочными заболеваниями. БЦЖ-вакцинация Вашему ребенку будет проведена после исчезновения из его крови материнских антител к ВИЧ и снятия диагноза «Перинатальный контакт по ВИЧ». Реакцию Манту Вашему ребенку поставят в 6 месяцев и в 12 месяцев.

4. Прививки от коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС) и полиомиелита (Имовакс Полио) Ваш ребенок будет получать в 3 мес., 4,5 мес., 6 мес.

5. С 6-ти недельного возраста для профилактики пневмоцистной пневмонии (ПЦП) Ваш ребенок должен будет принимать бисептол в суспензии (3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) - 1 раз в день. Расчет дозы бисептола ведется на м.2 поверхности тела, поэтому врачу необходимо знать рост и вес ребенка ежемесячно.

6. Ваш ребенок наблюдается участковым педиатром и патронажной медицинской сестрой по месту жительства, а также состоит на учете в городском центре по профилактике и борьбе со СПИД (ул. Спортивная. 19 б, тел. 43-52-80).

7. Регулярные обследования необходимы для уточнения ВИЧ-статуса и состояния иммунной системы ребенка. К обычным обследованиям в детской поликлинике добавятся посещения педиатра-инфекциониста городского центра по профилактике и борьбе со СПИД для сдачи крови ребенком в 3, 6, 9, 12 месяцев, который сообщит Вам результаты анализов и всю необходимую информацию о ребенке (ул. Спортивная. 19 б. т. 43-52-80).



Чтобы сохранить здоровье Вашего ребенка, необходимо соблюдать несколько заповедей:

- *следите за чистотой в доме;*
- *наблюдайте за самочувствием и поведением ребенка;*
- *сообщайте врачу о замеченных симптомах или необычном поведении*

ребенка;

- строго выполняйте рекомендации педиатра - инфекциониста центра «Анти-СПИД» и участкового педиатра.

Разработчик: врач -неонатолог ОНПС Дмитриева А.А.

Согласовано: заведующая ОНПС Скаряднова Е.Ю.